



Ryegrass **MADONNA**

Tipo Ryegrass anual westernwoldicum

| | |
|---|---|
| Adaptabilidad | <ul style="list-style-type: none">▪ 2.200 - 3.700 mnsm |
| Densidad de siembra | <ul style="list-style-type: none">▪ 100 lb/ha |
| Días a germinación | <ul style="list-style-type: none">▪ 8 - 10 días |
| Primer pastoreo o corte | <ul style="list-style-type: none">▪ 75 - 80 días |
| Intervalo entre pastoreo o corte | <ul style="list-style-type: none">▪ 28 - 35 días |
| Duración de la pradera | <ul style="list-style-type: none">▪ 1 año - 6 a 8 cortes |
| pH | <ul style="list-style-type: none">▪ 5.0 - 7.0 |
| Requerimiento hídrico | <ul style="list-style-type: none">▪ 5 - 7 mm/m²/día |
| Producción | <ul style="list-style-type: none">▪ 21 - 23 ton/ha/corte |
| % de proteína en materia seca | <ul style="list-style-type: none">▪ 19 - 21% |
| Resistencia | <ul style="list-style-type: none">▪ Roya <i>Puccinia spp.</i> |
| Tolerancia | <ul style="list-style-type: none">▪ Sequía |
| Uso | <ul style="list-style-type: none">▪ Corte, pastoreo, ensilaje y resiembra |
| Asociación con | <ul style="list-style-type: none">▪ Otros ryegrasses y leguminosas |